

CAGNETTA



Regno: *Animalia*

Phylum: *Chordata*

Classe: *Actinopterygii*

Ordine: *Perciformes*

Sottordine: *Blennioidei*

Famiglia: *Blenniidae*

Genere: *Salaria*

Specie: *Salaria fluviatilis* ASSO 1801

Nome Comune: CAGNETTA

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Ha un corpo allungato e appiattito ventralmente. Il colore della pelle è bruno chiaro e giallo dorato con macchioline scure sul dorso, bianco giallastro sul ventre. La mascella superiore presenta quattro *barbigli*, da cui il pesce prende nome, utili per la ricerca del cibo sul fondo. Le pinne pettorali, ventrali e anali presentano una colorazione rossastra; quella dorsale, localizzata a metà circa del corpo, si presenta più scura.

ABITUDINI e ALIMENTAZIONE

Vive praticamente *attaccato al letto dei fiumi e torrenti*, che tasta con le pinne, preferendo fondali di ghiaia e pietrisco, con acque pulite e correnti. Si alimenta di *vermi e larve* sia di *insetti* che di pesci che trova sul fondale. Ha caratteristiche onnivore e cerca il cibo soprattutto all'imbrunire o di notte.

HABITAT – AREA DI DISTRIBUZIONE – RIPRODUZIONE

Raggiunge la maturità sessuale quando misura all'incirca 15/18 centimetri. Il periodo della riproduzione si manifesta in tarda primavera o agli inizi dell'estate da fine aprile ai primi di luglio. Le uova sono depositate sui fondali fra le rocce al centro delle correnti.

STATUS E CONSERVAZIONE

Meno preoccupazione.

LIVELLO DI PROTEZIONE

La specie è negli allegati II e V della Direttiva Habitat dell'Unione Europea e nell'appendice III della Convenzione di Berna.